



Διαχείριση του ασθενούς με Ψωριασική Αρθρίτιδα: Δεδομένα από την καθημερινή κλινική πρακτική

Brian Jackson, *Untitled 6*
Artwork from Reflections Art in Health



Η αξία των δεδομένων της συνήθους κλινικής πρακτικής στην ψωριασική αρθρίτιδα: η μελέτη PsABio

Δρ. Παναγιώτης Αθανασίου, Ρευματολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας
Συντονιστής Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Διευθυντής
Παθολογικού Τομέα
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»


Brian Jackson, *Untitled 6*
Artwork from Reflections Art in Health

Τιμητική αμοιβή από τις εταιρείες:

- *JANSSEN*
- *GENESIS*
- *ROCHE*

Κλινικές Εκδηλώσεις Ψωριασικής Αρθρίτιδας

Ομάδα GRAPPA



Ritchlin et al, Ann Rheum Dis 2009; 68:1387-94, Fernandez-Sueiro et al. Arthritis Rheum 2009; 61:386-392, Torre Alonso et al, Br J Rheumatol 1991; 30: 245-250, Brockbank et al, Ann Rheum Dis 2005; 64: 188-190

Ψωριασική Αρθρίτιδα

Το νόσημα με τα δύο πρόσωπα

**Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία
είναι σημαντική στην ΨΑ**

Real World Evidence (RWE)

Τι είναι τα RWE;

Real world Evidence είναι στοιχεία που προέρχονται από την καθημερινή κλινική πράξη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται στοιχεία από:

- ✓Μητρώα ασθενών
- ✓Case reports
- ✓Case series
- ✓Στοιχεία φαρμακοεπαγρύπνησης κ.α.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται εκτός του περιβάλλοντος μιας τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης

REGISTRIES IN RHEUMATOLOGY

- 1997. SCQM¹ (Switzerland)
- 1999. GISEA. LOHREN. MONITORNET² (Italy)
- 1999. ARTIS³ (STURE-Stockholm + SSATG-South Swedish) (Sweden)
- 2000. Dan-BIO⁴ (Denmark)
- 2000. BIOBADASER⁵ (Spain) Base de Datos de productos Biologicos de la Sociedad Espanola de Rheumatologica)
- 2000. Nor-DMARD⁶ (Norway)
- 2001. BSRBR⁷ (British Society for Rheumatology Biologic Register)
- 2001. RABBIT⁸ (Germany)
- 2002. ATTRA⁹ (Czech Republic)
- 2003. DREAM¹⁰ (Netherland)
- 2004. HRBT¹¹ (Greece)
- ROB-FIN¹² (Register Of Biologicals in Finland)
- RATIO¹³ (France)
- CORRONA¹⁴ (USA)
- BIOBADAMEX¹⁵ (Mexico)
- BIOBADABRAZIL¹⁶ (Brazil)
- Others

1. Gabay C, et al. *Rheumatology*. 2015 Sep;54(9):1664–72.

2. Sfriso P, et al. *Reumatismo*. 2009;61(2):132–9.

3. Wadström H, et al. *Scand J Rheumatol*. 2015;44(1):22–8.

4. Sørensen J, et al. *Ann Rheum Dis*. 2015;74(3):e12. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204867. Epub 2014 Feb 17.

5. Carmona L, et al. *Clin Exp Rheumatol*. 2014;32(5 Suppl 85):S163–7.

6. Olsen IC, et al. *Clin Exp Rheumatol*. 2014;32(5 Suppl 85):S158–62.

7. Watson K & Hyrich K. *Musculoskeletal Care*. 2003;1(1):58–64.

8. Gerhold K, et al. *Rheumatology*. 2015;54(10):1858–66.

9. Horák P, et al. *Clin Rheumatol*. 2013;32(10):1451–8.

10. Steunebrink LM, et al. *Clin Rheumatol*. 2016;35(3):609–15.

11. Flouri I, et al. *Semin. Arthritis Rheum*. 2014;43(4):447–57.

12. Virkki LM, et al. *Clin Rheumatol*. 2011;30(11):1447–54.

13. Mariette X, et al. *Rheumatology*. 2011;50(1):222–9.

14. Kavanaugh A, et al. *Ann Rheum Dis*. 2015;74(6):1150–5.

15. Ventura-Ríos L, et al. *Reumatol Clin*. 2012;8(4):189–9.

16. Fafá BP, et al. *Clin Rheumatol*. 2015;34(5):921–7.

Assessment of Ustekinumab and Tumor Necrosis Factor Alpha Inhibitor Therapies in Patients With Psoriatic Arthritis in Standard Health-Care Practice, a Prospective Observational Cohort



Προοπτική μελέτη παρατήρησης

>900 ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα

> 200 Έλληνες ασθενείς

8 ευρωπαϊκές χώρες

5.5 έτη διάρκεια
2.5 έτη στρατολόγηση,
3 έτη παρακολούθηση

Assessment of Ustekinumab and Tumor Necrosis Factor Alpha Inhibitor Therapies in Patients With Psoriatic Arthritis in Standard Health-Care Practice, a Prospective Observational Cohort




Ασθενείς με ΨΑ
υπό TNFi

- 1^η γραμμή βιολογικής θεραπείας
- 2^η γραμμή βιολογικής θεραπείας
- 3^η γραμμή βιολογικής θεραπείας

Ασθενείς με ΨΑ
υπό UST

- 1^η γραμμή βιολογικής θεραπείας
- 2^η γραμμή βιολογικής θεραπείας
- 3^η γραμμή βιολογικής θεραπείας


PsABio ενδιάμεση ανάλυση: υπότυποι ψωριασικής αρθρίτιδας στους ευρωπαίους και Έλληνες ασθενείς



PsABio ενδιάμεση ανάλυση: βαρύτητα ψωρίασης σε Έλληνες και ευρωπαίους ασθενείς με ΨΑ




Βαρύτητα ψωρίασης στους Έλληνες ασθενείς με βάση το δείκτη BSA



■ <3% ■ 3% - 10% ■ >10%

Βαρύτητα ψωρίασης στους ευρωπαίους ασθενείς με βάση το δείκτη BSA




■ < 3% ■ 3% - 10% ■ > 10%

PsABio ενδιάμεση ανάλυση: ενεργότητα της νόσου των αρθρώσεων των ευρωπαίων και Ελλήνων ασθενών με ΨΑ



Ενεργότητα αρθρίτιδας με βάση τους δείκτες DAS28 και DAPSA



PsABio ενδιάμεση ανάλυση: παρουσία συννοσηροτήτων και καρδιαγγειακή συννοσηρότητα σε ευρωπαίους και Έλληνες ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα

