



ΕΠΕΜΥ

Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία

Rituximab στο σκληρόδερμα / Ελλάδα

Δεδομένα από 3 κέντρα στην Ελλάδα όπου ασθενείς με ΔΙΑΜΕΣΗ πνευμονική νόσο σκληροδέρματος έλαβαν Rituximab (RTX, n= 33) ή συμβατική θεραπεία (n= azathioprine (n=2), methotrexate (n=6) ή mycophenolate mofetil (n=10))

Μετά από μια μέση παρακολούθηση 4 ετών, το RTX φάνηκε να έχει ευεργετικές δράσεις τόσο στην πνευμονική λειτουργία (βελτίωση στο FVC στα 2 χρόνια) όσο και στην δερματική ίνωση , με παρόμοιο ποσοστό ΑΕ μεταξύ των 2 ομάδων

A multi-center, open-label, comparative study of B-cell depletion therapy with Rituximab for systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. Dimitrios Daoussis, M.D.a, , 1, , Konstantinos Melissaropoulos, M.D.a, 1, Georgios Sakellaropoulos, Ioannis Antonopoulos, M.D.a, Theodora E. Markatseli, M.D.b, Theodora Simopoulou, M.D.c, Panagiotis Georgiou, M.D.d, Andrew P. Andonopoulos, M.D.a, Alexandros A. Drosos, M.D.b, Lazaros Sakkas, M.D., DM, PhD(UK), FRCP(UK)c, Stamatis-Nick Liossis, M.D.a **Seminars in Arthritis and Rheumatism** Available online **13 October 2016**