



ΕΠΕΜΥ

Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία

Λιγότερο από τους μισούς με χρόνια οσφυαλγία και χαρακτηριστικά SpA έχουν τελικά SpA

Δεδομένα από 751 ασθενείς με **χρόνια οσφυαλγία** (> 3 μήνες, ηλικία < 45y) και **1** χαρακτηριστικό σπονδυλοαρθροπάθειας (πχ HLAB27, MRI ή α/α θετική, φλεγμ πόνος) που προσήλθαν για ρευματολογικό έλεγχο :

- το 46% είχε SpA
- το 47% πληρούσε τα ASAS κριτήρια (εκ των οποίων οι 2/3 είχαν nr axial SpA)

Frequency of Axial Spondyloarthritis Diagnosis Among Patients Seen by US Rheumatologists for Evaluation of Chronic Back Pain. Atul Deodhar^{1,*}, Philip J. Mease², John D. Reveille³, Jeffrey R. Curtis⁴, Su Chen⁵, Kailash Malhotra⁵ and Aileen L. Pangan⁵ **Arthritis & Rheumatology** . Volume 68, Issue 7, pages 1669–1676, July 2016 Version of Record online: **24 JUN 2016**. DOI: 10.1002/art.39612