

IL12/23: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Δέρμα, Μυοσκελετικό και Πεπτικό Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων

***Κλινική Εμπειρία από τη χρήση του Ustekinumab στη
Ψωρίαση***

Γρηγορίου Σταμάτης

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος,

Διευθυντής ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) ΕΚΠΑ

Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Σύγκρουση συμφερόντων

- Έχω λάβει αποζημιώσεις ταξιδιωτικών εξόδων, honorarium ή αποζημιώσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες τα τελευταία 2 χρόνια από τις κάτωθι εταιρείες:
- Janssen
- Abbvie
- LEO Pharma
- Novartis
- Menarini
- Pierre Fabre
- Johnson & Johnson
- BIANEX
- Frezyderm



ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

- ♂ 39 ετών (105kg) με ιστορικό ψωρίασης από 15ετίας
- Εκτεταμένη σοβαρή ψωρίαση
 - PASI 13.8
 - BSA 20%
- Ψωριασική ονυχία - NAPSI 32
- Μεταβολικό σύνδρομο (υπέρταση, υπερλιπιδαιμία)
- Καπνιστής
- Λήψη Κυκλοσπορίνης προ 5 ετίας → σταφυλοκοκκική πνευμονία → διακοπή θεραπείας
- Συνέχιση μόνο με τοπικά σκευάσματα
- DLQI 12







ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Έναρξη θεραπείας με Ustekinumab μετά τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο.
- Έναρξη με 90mg την εβδομάδα 0, 4 στην συνέχεια κάθε 12 εβδομάδες
- Μετά 28 εβδομάδες
 - Επίτευξη PASI 90
 - BSA: 5%
 - NAPSI: 0
 - DLQI: 3









Σημαντική Βελτίωση στην Ψωρίαση Ονύχων

Δεδομένα από τη μελέτη PHOENIX 1

Διάμεση ποσοστιαία βελτίωση του NAPSI από το baseline στις εβδομάδες 12 και 24




* $p \leq 0.001$
vs. placebo.


Βελτίωση στην Ψωρίαση Ονύχων

Δεδομένα από τη μελέτη PHOENIX 1

Median percent improvement in NAPSI at Week 52*



Βελτίωση στην Ψωρίαση Ονύχων Δεδομένα από τη μελέτη PHOENIX 1



**Ustekinumab in nail psoriasis: an open-label, uncontrolled,
nonrandomized study**

Journal of Dermatological Treatment. 2011; Early Online, 1–5

AIKATERINI PATSATSI, AIKATERINI KYRIAKOU & DIMITRIOS SOTIRIADIS

**Ustekinumab improves nail disease in patients with
moderate-to-severe psoriasis: results from PHOENIX 1**

P. Rich,¹ M. Bourcier,² H. Sofen,³ S. Fakharzadeh,⁴ Y. Wasfi,⁵ Y. Wang,⁵ U. Kerkmann,⁶ P.-D. Ghislain⁷ and
Y. Poulin;⁸ on behalf of the PHOENIX 1 investigators

407


**Efficacy of Ustekinumab in Nail Psoriasis and
Improvement in Nail-Associated Quality of
Life in a Population Treated with Ustekinumab
for Cutaneous Psoriasis: An Open Prospective
Unblinded Study**

Dermatology

D. Rigopoulos^a S. Gregoriou^a M. Makris^a D. Ioannides^b


Δεδομένα καθημερινής Κλινικής Πρακτικής

Σημαντική Βελτίωση του NAPSI




Δεδομένα καθημερινής Κλινικής Πρακτικής

Βελτίωση QoL



Μακροχρόνια ανταπόκριση στο Ustekinumab (μετά από 5 έτη) PHOENIX 2

- Έως την εβδομάδα 244, το 28.1% (139/494) και το 31.3% (152/485) των ασθενών που έλαβαν UST 45mg και UST 90mg πέτυχε **PASI 100**



45 mg, n = 409

409

589

591

584

580

568

555

553

550

548

538

538

533

527

524

517

512

508

504

499

494

90 mg, n = 411

411

587

594

585

577

566

558

552

551

542

538

534

531

524

522

515

507

507

503

499

485


*Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν την εβδομάδα 0. Ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία λόγω μη ανταπόκρισης ή λόγω Protocol deviations, συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση ως non-responders. Ασθενείς με μη πλήρη στοιχεία την εβδομάδα 12 δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση

** Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν την εβδομάδα 0 σε UST 45mg ή 90mg. Οι ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο και πέρασαν σε θεραπεία μετά την εβδομάδα 12, συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση μετά τη εβδομάδα 24

¹ άλλα σχετικά στοιχεία έχουν δημοσιευτεί από Papp KA, et al. *Lancet*. 2008;371:1675-1684. και Langley RG, et al. *BR J Dermatol*. 2015;172(5):1371-83

Langley R et al. *BJD* 2015;172:1371-83

Μακροχρόνια ανταπόκριση στο Ustekinumab (μετά από 5 έτη) PHOENIX 1




*Note: Placebo cross-over patients are included beginning at Week 24 (i.e. 12 weeks after UST treatment). Analyses were not conducted between Weeks 40 and 76 when the majority of the population was withdrawn from treatment per study design. Analyses resumed at Week 76 when about half of the withdrawn patients had reinitiated UST for at least 12 weeks. Patients who reinitiated treatment after Week 76 were re-included after at least 12 weeks of re-treatment.

UST 90 mg is indicated for patients with a body weight of ≥ 100 kg.

UST: ustekinumab; PASI: psoriasis area severity index

Χρόνος παραμονής σε θεραπεία 1^{ης} γραμμής (Καμπύλες επιβίωσης Kaplan–Meier από το registry της PSOLAR)




Drug Survival of Biologics in Psoriasis

A Prospective Observational Cohort Study From BADBIR

British Association of Dermatologists Biologic Interventions Register (**BADBIR**):

- **3523 biologic-naïve** patients with at least 6 months' FU data after initiation of biologic therapy were included in the study from a data cut in August 2014

Crude **Drug Survival of the First Biologic** Course Showing Disaggregated Biologic Data




IL12/23: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Δέρμα,
Μυοσκελετικό και Πεπτικό
Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων

Γιατί προσβάλλονται τα νύχια στην ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα;

- Γιατί υπάρχει προσβολή των τελικών φαλάγγων


Βελτίωση στην Ψωρίαση Ονύχων Δεδομένα από τη μελέτη RHOENIX 1



οστεοαρθρίτιδα




T1-weighted fat-suppressed post contrast axial images
υγιής ΟΑ ΨΑ




Πάχυνση
Και
Φλεγμονή:
ΕΝΘΕΣΙΤΙΔΑ

Η στενή σχέση ενθεσίτιδας και ψωρίασης των ονύχων.
Η ένθεση του εκτείνοντος τένοντα



Τομή ΑΦΦ, τρίχρωμη Masson's




SL, επιπολής πέταλο
DL, εν τω βάθει πέταλο

IL-23 induces spondyloarthritis by acting on ROR- γ ⁺CD3⁺CD4⁻CD8⁻ entheseal resident T cells


B10.RIII ποντίκια




hAATmc



IL-23mc




Day 6



Sherlock JP et al. Nat Med 2012;18:1069-76

IL-23 and Resident T Cells Promote Enthesitis and Osteoproliferation



Lories R, et al. *Nat Med.* 2012;18:1018-1019.^[23]

IL12/23: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Δέρμα,
Μυοσκελετικό και Πεπτικό
Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων

Κλινική Εμπειρία από τη χρήση του Ustekinumab στη Ψωριασική Αρθρίτιδα

Π Γεωργίου

Ρευματολόγος

**Συντ. Δ/ντής Ρευματολογικού Τμήματος Γ. Ν.
Πατρών**

Σύγκρουση συμφερόντων Conflict of interest

Janssen-Cilag Pharmaceutical SACI για αυτήν την παρουσίαση

Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Roche, UCB, Bristol, MSD, Novartis, Abbvie, Enorasis, Genesis

Ασθενής με: ψωριασική αρθρίτιδα- Ψωρίαση και Συμπτωματολογία ΙΦΝΕ

- Γυναίκα, 75 ετών, έγγαμη, οικιακά
- 1970 (27 ετών) : Έναρξη νόσου (Ψωρίασης)

- -

- 6/3/2015: τρίτη επίσκεψη στο Ρευματολογικό Ιατρείο

2012-2015

- Επεισόδια περιφερικής αρθρίτιδας
- Εξάρσεις εξανθήματος
- διαταραχές κενώσεων, κολονοσκόπηση, νόσος Crohn μη επιβεβαιωμένη.
- MTX: έλκη στοματικού βλεννογόνου
- Κορτικοειδή per os

συννοσηρότητες

- ✓Σακχαρώδης διαβήτης υπό γκλιμεπιρίδη και μετφορμίνη
- ✓Μετρίου βαθμού νεφρική ανεπάρκεια: κάθαρση κρεατινίνης=46ml/min
(ΦΤ=80-140)

Τρίτη επίσκεψη: 6/3/2015

- Περιφερική πολυαρθρίτιδα (8Ε, 10Δ αρθρώσεις)
- Εξάνθημα έκτασης ~25% επιφάνειας σώματος
- Ήπια αναιμία: Ht=32%, Hb=9,1g/dl
- ΤΚΕ=89mm/1h
- CRP=2,1mg/dl (ΦΤ=0,338mg/dl)

Το επόμενο βήμα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ: έναρξη αγωγής με βιολογικό παράγοντα

➤ παρουσία >3 διογκωμένων και >3 ευαίσθητων αρθρώσεων, παρά την επαρκή θεραπευτική δοκιμή για ≥ 3 μήνες με συνθετικά DMARDs.

Εναλλακτικά


➤ αποδεδειγμένης αντένδειξης ή δυσανεξίας ή τοξικότητας της θεραπείας με DMARDs.

Η εποχή των βιολογικών

- **6/3/2015-7/10/2015: adalimumab 40mg/2w**
- **2/11/2015-5/4/2016: infliximab 400mg/8w αρχικά, 400mg/6w στην συνέχεια (ΒΣ=70kg)**
- 1. Generini S, Giacomelli R, Fedi R, et al. Infliximab in spondyloarthropathy associated with Crohn's disease: an open study on the efficacy of inducing and maintaining remission of musculoskeletal and gut manifestations. *Ann Rheum Dis*. 2004 Dec. 63(12):1664-9.
- 2. Van Den Bosch F, Kruithof E, Baeten D, et al. Randomized double-blind comparison of chimeric monoclonal antibody to tumor necrosis factor alpha (infliximab) versus placebo in active spondylarthropathy. *Arthritis Rheum*. 2002 Mar. 46(3):755-65.
- 3. Herfarth H, Obermeier F, Andus T, Rogler G, Nikolaus S, Kuehbacher T, et al. Improvement of arthritis and arthralgia after treatment with infliximab (Remicade) in a German prospective, open-label, multicenter trial in refractory Crohn's disease. *Am J Gastroenterol*. 2002 Oct. 97(10):2688-90.
- 4. Kaufman I, Caspi D, Yeshurun D, Dotan I, Yaron M, Elkayam O. The effect of infliximab on extraintestinal manifestations of Crohn's disease. *Rheumatol Int*. 2005 Aug. 25(6):406-10.
- 5. Barrie A, Regueiro M. Biologic therapy in the management of extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. *Inflamm Bowel Dis*. 2007 Nov. 13(11):1424-9.
- **Διακοπή λόγω ανεπαρκούς απόκρισης από τις αρθρώσεις, το δέρμα και το έντερο**

Έξαρση της νόσου την Άνοιξη 2016


PsARC (Psoriatic Arthritis Response Criteria)		
	PsARC Index	18
Γνώμη ασθενούς (0-5)		4
Γνώμη ιατρού (0-5)		3
Αριθμός διογκωμένων αρθρώσεων		6
Αριθμός ευαίσθητων αρθρώσεων		5



Έξαρση της νόσου την Άνοιξη 2016

DAPSA (Disease Activity in Psoriatic Arthritis) Score


Tender Joints



1. Tender Joints Count (0-68), TJ:

0 6

Swollen Joints



2. Swollen Joints Count (0-66), SJ:

0 5

3. CRP (mg/dl):

2 5 0

4. Patient's assessment of disease activity and pain

- How active was your rheumatic disease on average during the last week?

not active 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 very active

- How would you describe the overall level of joint pain during the last week?

none 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 very severe

DAPSA = TJ + SJ + CRP + Activity + Pain =

24,5

Disease Activity: 0-4 Remission, 5-14 low, 15-28 moderate, >28 high Disease Activity

Μέτριας βαρύτητας ψωριασικό εξάνθημα (PASI=4,5)


HEAD							ARMS							
Area (%)	0	<10	10-29	30-49	50-69	70-89	90-100	0	<10	10-29	30-49	50-69	70-89	90-100
Erythema	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		
Induration	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		
Desquamation	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		

TRUNK							LEGS							
Area (%)	0	<10	10-29	30-49	50-69	70-89	90-100	0	<10	10-29	30-49	50-69	70-89	90-100
Erythema	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		
Induration	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		
Desquamation	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		

- **17/6/2016: ustekinumab 45mg την ημέρα 0, 30 και μετά κάθε 3 μήνες
ΥΔ**

23/12/2016: 6 μήνες μετά...


PsARC (Psoriatic Arthritis Response Criteria)		
PsARC index	5	
ΔPsARC index		18-5=13
Γνώμη ασθενούς (0-5)	2	
Γνώμη ιατρού (0-5)	1	
Αριθμός διογκωμένων αρθρώσεων	2	
Αριθμός ευαίσθητων αρθρώσεων	0	



Απρίλιος 2018: σχεδόν 2 χρόνια μετά

DAPSA (Disease Activity in Psoriatic Arthritis) Score


Tender Joints



1. Tender Joints Count (0-68), TJ:

0

Swollen Joints



2. Swollen Joints Count (0-66), SJ:

0

3. CRP (mg/dl):

0.30

4. Patient's assessment of disease activity and pain

- How active was your rheumatic disease on average during the last week?

not active 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 very active

- How would you describe the overall level of joint pain during the last week?

none 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 very severe

DAPSA = TJ + SJ + CRP + Activity + Pain =

4.3

Disease Activity: 0-4 Remission, 5-14 low, 15-28 moderate, >28 high Disease Activity



Απρίλιος 2018: Σημαντική βελτίωση

HEAD								ARMS						
Area (%)	0	<10	10-29	30-49	50-69	70-89	90-100	0	<10	10-29	30-49	50-69	70-89	90-100
Erythema	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		
Induration	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		
Desquamation	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		

TRUNK								LEGS						
Area (%)	0	<10	10-29	30-49	50-69	70-89	90-100	0	<10	10-29	30-49	50-69	70-89	90-100
Erythema	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		
Induration	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		
Desquamation	0	1	2	3	4			0	1	2	3	4		

PASI:1,7
 Δ PASI:4,4-1,7=2,8

Ustekinumab

αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία

- **Επαγωγή ύφεσης** της νόσου μετά την αποτυχία της MTX και δύο TNFi
- **Διατήρηση της ύφεσης** μέχρι και σήμερα

Safety and Effectiveness of Ustekinumab for the Treatment of Psoriatic Arthritis over a 6 Month Period

BioTRAC: Καναδικό αρχείο καταγραφής ασθενών με


- ΡΑ υπό Infliximab, Golimumab
- ΑΣ υπό Infliximab, Golimumab
- ΨΑ υπό Infliximab, Golimumab και Ustekinumab

63 ασθενείς

- 63,5% γυναίκες
- Μέση ηλικία: 52,8+11,2
- Μέση διάρκεια νόσου: 5,5+8,1
- **100% πρώτος βιολογικός παράγοντας**

Safety and Effectiveness of Ustekinumab for the Treatment of Psoriatic Arthritis over a 6 Month Period

Clinical Outcomes at 6 Months



*p<0.05, **p<0.001 (between-visit changes from BL to month 6)

Safety and Effectiveness of Ustekinumab for the Treatment of Psoriatic Arthritis over a 6 Month Period

Ασφάλεια στους 6 μήνες

- 36 ΑΕ σε 21 ασθενείς
- ✓ **Έπιες: 26/36 = 72%**
- ✓ Πιθανή συσχέτιση με το φάρμακο: $4/36 = 11,1\%$
- ✓ **Πολύ πιθανή συσχέτιση με το φάρμακο: $3/36 = 8,3\%$**

The results of this analysis demonstrate that UST, administered to PsA pts in a routine clinical care setting, is safe and effective in improving clinical outcomes over 6 months of treatment.

Minimal disease activity in patients with psoriatic arthritis treated with ustekinumab: results from a 24-week real-world study

34 ασθενείς με ΨΑ, c DMARDs-IR, TNFi-IR

Κύριο καταληκτικό σημείο: ελάχιστη δραστηριότητα νόσου μετά 24 εβδομάδες θεραπείας με UST

Ελάχιστη Δραστηριότητα Νόσου (Minimal Disease Activity - MDA)


(L C Coates et al Ann Rheum Dis 2010;69:48–53)

ασθενείς με ΨΑ που πληρούν 5/7 ακόλουθα κριτήρια:

- Αριθμός ευαίσθητων αρθρώσεων ≤ 1
- Αριθμός διογκωμένων αρθρώσεων ≤ 1
- PASI ≤ 1 or BSA ≤ 3
- VAS πόνου (εκτίμηση ασθενούς) ≤ 15
- VAS σφαιρική δραστηριότητα νόσου (εκτίμηση ασθενούς) ≤ 20
- HAQ ≤ 0.5
- Ευαίσθητες ενθέσεις ≤ 1

Minimal disease activity in patients with psoriatic arthritis treated with ustekinumab: results from a 24-week real-world study

Ελάχιστη δραστηριότητα νόσου
(εβδομάδα 24)
70,5% (24/34) των ασθενών



Μετρήσεις εκβάσεων (μέση τιμή $\pm$ SD) των κριτηρίων MDA στην έναρξη και μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας με το ustekinumab


Κριτήρια MDA	Εβδομάδα 0	Εβδομάδα 24	Τιμή p
TJC (0-68)	7,0 $\pm$ 4,2	1,6 $\pm$ 1,4	0,001
SJC (0-66)	1,5 $\pm$ 1,5	0,3 $\pm$ 0,5	0,01
PASI (0-72)	15,4 $\pm$ 9,5	1,8 $\pm$ 4,2	0,001
BSA (%)	58 $\pm$ 17,2	3 $\pm$ 10,5	0,001
Πόνος ασθενούς VAS (0-100 mm)	53 $\pm$ 18,4	9,6 $\pm$ 7,6	0,01
PtGA (0-100 mm)	58,1 $\pm$ 15,8	10,3 $\pm$ 7,9	0,01
HAQ (0-3)	1,2 $\pm$ 0,8	0,1 $\pm$ 0,4	0,01
Ευαίσθητα σημεία ένθεσης (0-13)	2,1 $\pm$ 3,5	0,5 $\pm$ 1,2	0,01
MDA (%)	0	70,5	0,01

• Την εβδομάδα 24 παρατηρήθηκε επίσης σημαντική διαφορά στο επίπεδο της CRP έναντι της έναρξης ($p < 0,01$) και βελτίωση στο επίπεδο της ESR έναντι της έναρξης (μη σημαντική)

Ustekinumab for the treatment of psoriatic arthritis (results of the first interim analysis of the non-interventional study SUSTAIN)


- ❑ προοπτική, πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης σε ασθενείς με **ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)** υπό αγωγή με ustekinumab.
(παρακολουθούνται σύμφωνα με την καθημερινή κλινική πρακτική)
- ❑ η μελέτη στοχεύει να αξιολογήσει **400 ασθενείς σε 75 κέντρα για 160 εβδομάδες** με επισκέψεις των ασθενών τις εβδομάδες 0, 4 και στη συνέχεια κάθε 12 εβδομάδες.
- ❑ **Σημεία αξιολόγησης:**
 - ✓ αριθμός TJC και SJC
 - ✓ ευαίσθητες ενθέσεις
 - ✓ BSA και PASI
 - ✓ αναφερόμενη από τον ασθενή ενεργότητα της νόσου/πόνος
 - ✓ ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της υγείας (HAQ)
 - ✓ ποιότητα ζωής (SF-12),
 - ✓ ικανοποίηση ασθενούς/ιατρού από την θεραπεία
 - ✓ ΑΕ

Ustekinumab for the treatment of psoriatic arthritis - results of the first interim analysis of the non-interventional study sustain



Η πλειονότητα των ασθενών και των ιατρών αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα & ασφάλεια του ustekinumab 'καλή/πολύ καλή' την εβδομάδα 16 Συμφωνία ασθενών - Ιατρών

IL-23 and Resident T Cells Promote Enthesitis and Osteoproliferation




Lories R, et al. *Nat Med.* 2012;18:1018-1019.^[23]

Ustekinumab is superior to TNF inhibitor treatment in resolving enthesitis in PsA patients with active enthesitis

Ανοικτή, προοπτική μελέτη παρατήρησης


Κύριο καταληκτικό σημείο: **SPARCC=0** μετά 6 μήνες θεραπείας

Enthesitis indices




LEI
6 sites

- ❶ Lateral epicondyle humerus
- ❷ Medial condyle femur
- ❸ Achilles tendon
- ❹ 1st costochondral
- ❺ 7th costochondral



MASES
13 sites

- ❻ Anterior superior iliac spine
- ❼ Iliac crest
- ❽ Posterior superior iliac spine
- ❾ 5th lumbar spinous process
- ❿ Supraspinatus insertion



SPARCC
18 sites, score of 16*

0-16


- ❶ Lateral epicondyle humerus
- ❷ Greater trochanter
- ❸ Quadriceps insertion into superior border of patella
- ❹ Patellar tendon insertion into inferior pole of patella OR tibial tubercle*
- ❺ Insertion plantar fascia

SPARCC=Spondyloarthritis Research Consortium of Canada

Ustekinumab is superior to TNF inhibitor treatment in resolving enthesitis in PsA patients with active enthesitis


Ανοικτή, προοπτική μελέτη παρατήρησης

Κύριο καταληκτικό σημείο: SPARCC=0 μετά 6 μήνες θεραπείας



Ustekinumab is superior to TNF inhibitor treatment in resolving enthesitis in PsA patients with active enthesitis

Ασθενείς που πέτυχαν SPARCC=0 μετά από 6 μήνες



Προσαρμογή από Araujo et al. 2017.

OR=0,037
p=0,005


Οι ασθενείς που λαμβάνουν ustekinumab να είναι πιο πιθανό να μην παρουσιάσουν σημεία ενθεσίτιδας μετά από 6 μήνες

Ευχαριστώ πολύ


IL12/23: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Δέρμα,
Μυοσκελετικό και Πεπτικό
Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων

PSOLAR

Χρόνος παραμονής στη θεραπεία (Καμπύλες επιβίωσης Kaplan–Meier): 3^η γραμμής θεραπεία



Cumulative Incidence Rates of Adverse Events of Special Interest (AEoSI)



Cumulative incidence rates for UST were numerically lower or comparable with other biologics and non biologics cohorts in the registry

Μητρώο DERMIBIO

Absolute numbers and incidence rates of adverse events per 100 treatment-years

Table 3 Absolute numbers and incidence rates of adverse events per 100 treatment-years

	Any adverse event	Infection	NMSC	Cardiovascular	Neurological	Other/unspecified
Adalimumab						
Total number of events, n	1221	651	17	19	44	490
Treatment series with event, n (%)	793 (59.5)	390 (29.3)	13 (1.0)	18 (1.4)	40 (3.0)	332 (24.9)
IR (95% CI)	32.6 (30.8–34.4)	17.4 (16.1–18.7)	0.5 (0.3–0.7)	0.5 (0.3–0.8)	1.2 (0.9–1.6)	13.1 (12.0–14.3)
Etanercept						
Total number of events, n	413	193	6	5	12	197
Treatment series with event, n (%)	291 (50.3)	118 (20.4)	6 (1.0)	5 (0.9)	12 (2.1)	150 (25.9)
IR (95% CI)	29.1 (26.5–32.1)	13.6 (11.8–15.7)	0.4 (0.2–0.9)	0.4 (0.1–0.8)	0.8 (0.5–1.5)	13.9 (12.1–16.0)
Infliximab						
Total number of events, n	223	87	3	1	6	126
Treatment series with event, n (%)	164 (49.2)	65 (19.5)	2 (0.6)	1 (0.3)	6 (1.8)	90 (27.0)
IR (95% CI)	31.0 (27.2–35.3)	12.1 (9.8–14.9)	0.4 (0.1–1.3)	0.1 (0.0–1.0)	0.8 (0.4–1.9)	17.5 (14.7–20.9)
Secukinumab						
Total number of events, n	52	25	0	4	4	19
Treatment series with event, n (%)	50 (25.5)	23 (11.7)	0 (0.0)	4 (2.0)	4 (2.0)	19 (9.7)
IR (95% CI)	39.7 (30.2–52.0)	19.1 (12.9–28.2)	Not applicable	3.1 (1.1–8.1)	3.1 (1.1–8.1)	14.5 (9.2–22.7)
Ustekinumab						
Total number of events, n	612	325	11	10	25	241
Treatment series with event, n (%)	463 (43.9)	235 (22.3)	7 (0.7)	10 (0.9)	25 (2.4)	186 (17.6)
IR (95% CI)	24.3 (22.4–26.3)	12.9 (11.6–14.4)	0.4 (0.2–0.8)	0.4 (0.2–0.7)	1.0 (0.7–1.5)	9.6 (8.4–10.8)

NMSC, nonmelanoma skin cancer; IR, incidence rate per 100 treatment-years; CI, confidence interval.

Το ustekinumab δεν διαταράσσει τις συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις: δεδομένα 3-ετούς παρατήρησης από τη μελέτη PHOENIX 1

Διάμεση μεταβολή των τιμών εργαστηριακών παραμέτρων από την αρχή της μελέτης έως τα 3 έτη

<u>Lab Parameter</u>	<u>UST 45 mg</u>	<u>UST 90 mg</u>	<u>UST Combined</u>
WBC (10 ³ /μL)	0.00 (-1.00, 1.10)	0.00 (-1.00, 0.90)	0.00 (-1.00, 0.90)
Neutrophils (10 ³ /μL)	-0.12 (-1.01, 0.59)	-0.11 (-0.88, 0.65)	-0.12 (-0.97, 0.62)
Lymphocytes (10 ³ /μL)	0.10 (-0.16, 0.36)	0.06 (-0.18, 0.32)	0.08 (-0.18, 0.34)
Hemoglobin (g/dL)	-0.10 (-0.60, 0.50)	-0.20 (-0.70, 0.30)	-0.10 (-0.60, 0.40)
Platelets (10 ³ /μL)	-29.00 (58.50, -7.00)	-30.00 (-51.00, -13.00)	-29.50 (-54.00, -11.00)
AST/SGOT (IU/L)	-2.00 (-4.00, 2.00)	-2.00 (-5.00, 4.00)	-2.00 (-5.00, 3.00)
ALT/SGPT (IU/L)	0.00 (-6.50, 6.00)	0.00 (-8.50, 8.00)	0.00 (-7.00, 7.00)
Creatinine (mg/dL)	0.00 (0.00, 0.10)	0.00 (0.00, 0.10)	0.00 (0.00, 0.10)
Total Bilirubin (mg/dL)	-0.10 (-0.20, 0.00)	-0.10 (-0.20, 0.00)	-0.10 (-0.20, 0.00)

IL12/23: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Δέρμα,
Μυοσκελετικό και Πεπτικό
Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων



Prevalence and Characteristics of Extra-intestinal Manifestations in a Large Cohort of Greek Patients with Inflammatory Bowel Disease

Konstantinos Karmiris,^a Anastasios Avgerinos,^b Aikaterini Tavernaraki,^a Christos Zeglinas,^c Pantelis Karatzas,^d Theodoros Koukouratos,^d Konstantinos A. Oikonomou,^e Athanasios Kostas,^f Evanthia Zampeli,^g Vasileios Papadopoulos,^h Angeliki Theodoropoulou,^a Nikos Viazis,^d Dimitrios Polymeros,^h Spyridon Michopoulos,^g Giorgos Bamias,^f Andreas Kapsoritakis,^e Dimitrios G. Karamanolis,^d Gerassimos J. Mantzaris,^d Charalampos Tzathas,^c Ioannis E. Koutroubakis^b

Prevalence and Characteristics of Extra-intestinal Manifestations in a Large Cohort of Greek Patients with Inflammatory Bowel Disease

	Total [1860]	Crohn's disease [1001]	Ulcerative colitis [859]	CD vs. UC
<i>Mucocutaneous</i>	14 %	16.9 %	10.6 %	NS
<i>Erythema nodosum</i>	5.3 %	7.5 %	2.8 %	0.005
<i>Pyoderma gangrenosum</i>	0.8 %	0.7 %	0.9 %	NS
<i>Psoriasis</i>	2.7 %	3.3 %	2.1 %	NS
<i>Sweet's syndrome</i>	0.2 %	0.2 %	0.2 %	NS
<i>Hidradenitis suppurativa</i>	0.3 %	0.4 %	0.1 %	NS
<i>Aphthous stomatitis</i>	6.1 %	6.9 %	5.2 %	NS


Prevalence and Characteristics of Extra-intestinal Manifestations in a Large Cohort of Greek Patients with Inflammatory Bowel Disease

Table 4. Correlation between different extraintestinal manifestations in inflammatory bowel disease patients.

OR [95% CI] [p-value]	Ankylosing spondylitis	Sacroiliitis	Mucocutaneous EIMs	Erythema nodosum	Ocular EIMs	DVT
Arthritic EIMs			0.1 [0.1–0.2] [< 0.0001]	2.6 [1.6–4.4] [< 0.0001]		0.2 [0.1–0.7] [0.009]
Peripheral arthritis	0.3 [0.1–0.6] [0.001]	0.4 [0.2–0.6] [< 0.0001]		0.4 [0.2–0.7] [0.007]		
Ankylosing spondylitis			0.2 [0.1–0.7] [0.005]		3.8 [1.6–8.7] [0.004]	
Mucocutaneous EIMs						

Προσβολή πεπτικού, αρθρώσεων
και δέρματος συνυπάρχουν συχνά

Association between psoriasis and inflammatory bowel disease: a Danish nationwide cohort study




Association between psoriasis and inflammatory bowel disease: a Danish nationwide cohort study

	Crude		
	IRR	95% CI	P-value
Risk of Crohn disease			
Any psoriasis	1.88	1.61–2.19	< 0.001
Mild psoriasis (no systemic therapy)	1.23	0.99–1.53	0.059
Severe psoriasis (hospital)	2.64	1.93–3.62	< 0.001
Severe psoriasis (medication)	2.79	1.68–4.63	< 0.001
Psoriatic arthritis	3.39	2.34–4.91	< 0.001
Risk of ulcerative colitis			
Any psoriasis	1.74	1.58–1.92	< 0.001
Mild psoriasis (no systemic therapy)	1.50	1.33–1.69	< 0.001
Severe psoriasis (hospital)	1.62	1.27–2.07	< 0.001
Severe psoriasis (medication)	2.02	1.40–2.90	< 0.001
Psoriatic arthritis	2.45	1.87–3.20	< 0.001


Ασθενείς με ψωρίαση
έχουν αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης Crohn's η
Ελκώδους

Genetic association between psoriasis and inflammatory bowel disease



Πρέπει να ελέγχονται οι ασθενείς με ψωρίαση για παρουσία Crohn η Ελκώδους?

- Όλοι?
- Συμπτωματικοί?
- Υψηλού κινδύνου?
 - Σημεία συναγερμού
 - Βιοδείκτες



Πιθανότητα
διάγνωσης IBD

IL12/23: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Δέρμα,
Μυοσκελετικό και Πεπτικό
Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων

Κλινική Εμπειρία από τη χρήση του *Ustekinumab* στη νόσο του Crohn

Μπάμιας Γιώργος,

Αν. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

συγκρουση συμφεροντων

Εχω λάβει τιμητικές αμοιβές απο τις εταιρείες

• Pfizer • Abbvie • Takeda Hellas • MSD • Shire • Janssen •
Aenorasis S.A., • Galenica

Περίπτωση ασθενούς

- Γυναίκα, 45 ετών
- Νόσος Crohn, διάγνωση το 1999
- Φαινότυπος κατά Montreal A2L3B1p
 - A2 διάγνωση μεταξύ 17-40 ετών
 - L3 διάχυτη προσβολή λεπτού και παχέος εντέρου
 - B1 φλεγμονώδης νόσος χωρίς στενώσεις ή εσωτερικά συρίγγια
 - P περιπρωκτική νόσος

Περίπτωση ασθενούς

ενδοσκόπηση



Περίπτωση ασθενούς

- Κορτικοστεροειδή στη διάγνωση
- Αζαθειοπρίνη έως το 2008
 - [αναφερόμενη διακοπή λόγω λευκοπενίας]
- Έναρξη infliximab το 2010
- Σε μακροχρόνια ύφεση της εντερικής νόσου και υποχώρηση των συριγγίων

Περίπτωση ασθενούς

- Καλοκαίρι 2017:
 - εμφάνιση εξανθήματος με αλωπεκία τριχωτού κεφαλής
 - Η εντερική νόσος σε κλινική ύφεση



Εμφάνιση δερματολογικής βλάβης σε ασθενή με ΙΦΝΕ υπό αγωγή

Άμεση συσχέτιση

Σχετιζόμενη με
ενεργότητα της
ΙΦΝΕ

Οζώδες ερυθημα



Ανεξάρτητη από
ενεργότητα της
ΙΦΝΕ

Γαγγραινώδες
πυόδερμα



Διαφορική διάγνωση νέου εξανθήματος σε ασθενή με ΙΦΝΕ που λαμβάνει θεραπεία με αντι-TNF

Spanish registry of biological therapies

Exposure to anti-TNF: **17,329 person-years**



Ρίσκο για ανεπιθύμητη δερματολογική εκδήλωση
53/1000 person-years



Λοιμώξεις
28/1000 p-y



Αυτοάνοση
δερματοπάθεια
5/1000 p-y



Νεοπλάσματα
3/1000 p-y

Πυρετός &
εξάνθημα =
προσοχή!!!


εξάνθημα και πυρετος σε ασθενή υπό αντι-TNF θεραπεία

Case Report


Atypical Mycobacterial Infection Presenting as Persistent Skin Lesion in a Patient with Ulcerative Colitis



Αρχική βλάβη




Ziehl-Neelsen



Μετά θεραπεία

Ψωριασικές βλάβες σε ασθενείς με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες




**Διαρκής αύξηση των
περιπτώσεων**

CD/UC	78/11 (%)
F/M ratio	1,3
Ηλικία (διάμεση)	26.5 (8-54)
Infliximab	69.37 %
Adalimumab	22.52 %
Certolizumab	2.70 %

Characteristics of Skin Lesions Associated With Anti-Tumor Necrosis Factor Therapy in Patients With Inflammatory Bowel Disease

A Cohort Study

Isabelle Cleynen, PhD; Wouter Van Moerkercke, MD; Thomas Billiet, MD; Pieter Vandecandelaere, MD; Niels Vande Casteele, PhD; Christine Breynaert, MD, PhD; Vera Ballet; Marc Ferrante, MD, PhD; Maja Noman, MD; Gert Van Assche, MD, PhD; Paul Rutgeerts, MD, PhD; Joost J. van den Oord, MD, PhD; Ann Gils, PharmD, PhD; Siegfried Segaert, MD, PhD*; and Séverine Vermeire, MD, PhD*



Όλοι οι τύποι δερματικών βλαβών ψωρίασης


- psoriasiform eczema 30.6%;
- Eczema 23.5%;
- xerosis cutis 10.6%;
- palmoplantar pustulosis 5.3%;
- Psoriasis 3.8%;
- Other 26.1%



Ψωρίαση επαγόμενη από anti-TNF παράγοντα

Συχνότερες εντοπίσεις των βλαβών σε ασθενείς με ψωρίαση επαγόμενη από anti-TNF

Κατανομή των ψωριασικών βλαβών σε 142 ασθενείς με Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου που εκδήλωσαν ψωρίαση ενώ βρίσκονταν σε θεραπεία με anti-TNF*



*Στους περισσότερους ασθενείς συμμετείχαν περισσότερες από μία περιοχές του σώματος

Ασθενής που αναπτύσσει ψωριασικόμορφο εξάνθημα υπό αντι-TNF



Εντατική δερματολογική θεραπεία/συνεργασία με δερματολόγο



All but 28 patients (11%) were successfully managed without needing to stop therapy because of lesions.

Επιμονή εξανθήματος/βαρεία δερματολογική βλάβη (<10%)



**Αλλαγή σε
άλλο αντι-TNF**




**Αλλαγή σε
vedolizumab**



**Αλλαγή σε
ustekinumab**

Anti-TNF antibody-induced psoriasiform skin lesions in patients with inflammatory bowel disease are characterised by interferon- γ -expressing Th1 cells and IL-17A/IL-22-expressing Th17 cells and respond to anti-IL-12/IL-23 antibody treatment.

Gut.2014 Apr;63(4):567-77



Χορήγηση ustekinumab οδήγησε
σε δραματική βελτίωση της
δερματικής βλάβης στο τριχωτό
της κεφαλής

Περίπτωση ασθενούς


- Είναι αποτελεσματικό το ustekinumab για τον έλεγχο της εντερικής φλεγμονής στην ασθενή (νόσος Crohn) ?

Δοσολογικό σχήμα εφόδου ustekinumab στη νόσο Crohn

Σωματικό βάρος ασθενούς κατά της χορήγηση της δόσης	Εφάπαξ ενδοφλεβια δόση (6mg/kg*)	Αριθμός φιαλιδίων 130 mg USTEKINUMAB
≤ 55 kg	260 mg	2
> 55 kg έως ≤ 85 kg	390 mg	3
> 85 kg	520 mg	4

Θεραπεία εφόδου

Κλινική ανταπόκριση την εβδομάδα 8




Δοσολογικό σχήμα συντήρησης ustekinumab στη νόσο Crohn

- **Πρώτη υποδόρια χορήγηση των 90 mg USTEKINUMAB εβδομάδα 8 μετά την ενδοφλέβια δόση.**
- **Ακολουθως χορήγηση κάθε 12 εβδομάδες.**
- **Ασθενείς χωρίς επαρκή ανταπόκριση 8 εβδομάδες μετά την πρώτη υποδόρια δόση, μπορεί να λάβουν δεύτερη υποδόρια δόση**
- **Ακολουθως δόση κάθε 8 εβδομάδες ή 12 εβδομάδες σύμφωνα με την κλινική εκτίμηση**
- **Ασθενείς που χάνουν την ανταπόκριση στην δοσολογία των 12 εβδομάδων, μπορεί να επωφεληθούν από την αύξηση της συχνότητας της δοσολογίας σε 8 εβδομάδες**

Θεραπεία συντήρησης


Κλινική ύφεση την Εβδομάδα 44 [CDAI <150]



Long-term Efficacy and Safety of Ustekinumab for Crohn's Disease: Results From IM-UNITI Long-term Extension Through 2 Years

Ποσοστά μακροχρόνιας κλινικής ύφεσης από την αρχή της μελέτης

Figure 9. Rates of Remission Through 2 Years in Original Randomized Induction Responder Populations^a




Περίπτωση ασθενούς

ενδοσκόπηση



Σύγκριση ανεπιθύμητων συμβάντων μεταξύ εικονικού φαρμάκου και ustekinumab στις μελέτες της v. Crohn




ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ PSOLAR

Στο συνολικό πληθυσμό των ασθενών με ψωρίαση, 276 (2,3%) είχαν και ΙΦΝΕ κατά την ένταξή τους στο μητρώο PSOLAR

- 21,7% των ασθενών της υποομάδας με ΙΦΝΕ, ήταν ασθενείς με νόσο του Crohn
- Οι σοβαρές λοιμώξεις (ποσοστά αθροιστικής επίπτωσης) στους ασθενείς με ΙΦΝΕ ήταν αριθμητικά περισσότερες συγκριτικά με το συνολικό πληθυσμό της PSOLAR (διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 3,4 έτη)
- Τα ποσοστά σοβαρών λοιμώξεων ήταν αριθμητικά χαμηλότερα με ustekinumab έναντι άλλων βιολογικών†

Αθροιστικά ποσοστά σοβαρών λοιμώξεων



Ανθρωποέτη (n)

Υποομάδα ΙΦΝΕ 218

Όλος ο πληθυσμός 7944

της PSOLAR

Προσαρμογή από Loftus EV et al. 2016.

IBD: inflammatory bowel disease.

†Infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab και άλλοι βιολογικοί.

● IBD subset

● Full PSOLAR population

An Integrated Safety Data Analysis Across All Phase II and Phase III Clinical Programs for Ustekinumab in Psoriatic Arthritis, Crohn's Disease, and Psoriasis

Η χορήγηση ustekinumab δε σχετίστηκε με αύξηση κινδύνου για ανεπιθύμητα συμβάματα σε καμία ένδειξη

Table 4. Safety Summary of PsO,

	Psoriasis		PsA		Crohn's		All Diseases Pooled	
	Placebo	UST	Placebo	UST	Placebo	UST	Placebo	UST
Pts treated	733	3117	379	1018	943	1749	2055	5884
Pt years of follow-up (Wks)	12.93	42.8	19.9	43.4	19.12	32.89	17.05	39.96
Avg duration of treatment (Wks)	4.9	26.49	11.96	27.66	9.87	18.8	8.41	24.41
Pts D/C due to AE (%)	17	86	22	31	45	108	84	225
Total pt years of follow-up	182	2566	145	850	347	1106	674	4521
Event rate per 100 PY								
AEs	414.81	390.6	343.41	254.24	712.16	641.63	552.41	426.39
SAEs	8.78	8.77	13.79	9.3	43.84	35.35	27.89	15.37
Infections	120.71	137.4	102.75	78.04	145.09	133.98	129.38	125.41
Serious Infections	1.65	1.4	0.69	0.84	6.92	6.42	4.15	2.54
Adjusted Death	0	0	0	0	0	0.09	0.3	0.46
Malignancy	0	0	0	0	0	0.36	0.15	0.35

Ασθενείς με νόσο Crohn εμφανίζουν περισσότερα ανεπιθύμητα συμβάματα σε σχέση με τη ψωρίαση και τη ψωριασική αρθρίτιδα

Θεραπευτικές επιλογές ασθενών με πολλαπλά ανοσολογικά νοσήματα



Table 1. BIOLOGIC AGENTS APPROVED FOR PSORIASIS AND PSORIATIC ARTHRITIS.

CD	UC	Treatment	Target	Approval Psoriasis	Approval Psoriatic Arthritis
ναι	ναι	Adalimumab	TNF- α	2008	2005
οχι	οχι	Apremilast	PDE4	2014	2014
ναι	οχι	Certolizumab Pegol	TNF- α	Not applicable	2013
οχι	οχι	Etanercept	TNF- α	2004	2002
οχι	ναι	Golimumab	TNF- α	Not applicable	2009
ναι	ναι	Infliximab	TNF- α	2006	2005
οχι	οχι	Secukinumab	IL 17A	2015	2015
ναι	οχι	Ustekinumab	IL 12/IL 23 p40	2009	2013

New biologics on the horizon include IL-17 and IL-23 inhibitors; JAK-inhibitors, and IL-23, as well as biosimilars. Abbreviations: IL, interleukin; TNF- α = tumor necrosis factor-alpha; JAK, Janus kinase; PDE-4, phosphodiesterase-4 inhibitor.

IL12/23: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Δέρμα,
Μυοσκελετικό και Πεπτικό
Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων

- Scalp psoriasis and biologic agents: a retrospective, comparative study from a tertiary psoriasis referral centre



IL12/23: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Δέρμα,
Μυοσκελετικό και Πεπτικό
Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων

Υπάρχουν εντοπίσεις της ψωρίασης που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψωριασικής αρθρίτιδας

1. Η ψωρίαση των ονύχων
2. Η ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής
3. Η ψωρίαση που εντοπίζεται μεσογλουτιαία / περιπρωκτικά

Incidence and Clinical Predictors of Psoriatic Arthritis in Patients With Psoriasis: A Population-Based Study

FLORANNE C. WILSON, MURAT ICEN, CYNTHIA S. CROWSON, MARIAN T. McEVOY, SHERINE E. GABRIEL, AND HILAL MARADIT KREMERs

Table 2. Predictors of psoriatic arthritis within the incidence cohort of psoriasis subjects*

	Univariate	Multivariate
Age, years†	0.91 (0.77–1.07)	0.92 (0.78–1.09)
Men (vs. women)	1.53 (0.90–2.59)	1.35 (0.78–2.33)
Calendar year†	0.78 (0.56–1.09)	0.76 (0.54–1.08)
Type of psoriasis		
Plaque	1.72 (0.81–3.63)	
Guttate	0.36 (0.09–1.48)	
Sebopsoriasis	1.96 (0.78–4.93)	
Pustular	—	
Unknown	0.82 (0.26–2.63)	
Site of psoriasis		
Scalp	3.89 (2.18–6.94)	3.75 (2.09–6.71)
Extremities	0.83 (0.47–1.45)	
Trunk	0.80 (0.40–1.58)	
Intergluteal/perianal	2.35 (1.32–4.19)	1.95 (1.07–3.56)
Face	1.15 (0.52–2.53)	
Palms and/or soles	0.20 (0.03–1.47)	
Axilla/groin	1.40 (0.44–4.48)	
Unknown	0.88 (0.32–2.44)	
No. of affected sites‡		
Unknown	1.06 (0.36–3.07)	
2 sites	0.77 (0.37–1.64)	
≥3 sites	2.24 (1.23–4.08)	
Nail dystrophy	2.93 (1.68–5.12)	2.24 (1.26–3.98)

* Values are the hazard ratio (95% confidence interval).

† Per 10-year increase.

‡ Versus 1.

Concise report

Alopecia induced by tumour necrosis factor- α antagonists: description of 52 cases and disproportionality analysis in a nationwide pharmacovigilance databaseJohana Béné^{1,2}, Guillaume Moulis^{3,4,5}, Marine Auffret^{1,2}, Guillaume Lefevre^{6,7}, Pascal Coquerelle⁸, Patrick Coupe⁹, Patrice Péré¹⁰ and Sophie Gautier^{1,2}**TABLE 1** Association between TNF- α antagonists and alopecia measured with reporting odds ratio (ROR)

Drug	Cases (<i>n</i> = 1068) % (<i>n</i>)	Non-cases (<i>n</i> = 282 590) % (<i>n</i>)	ROR (95% CI)
All TNF- α antagonists	4.9 (52)	1.7 (4742)	3.0 (2.3, 4.0)
Infliximab	1.7 (18)	0.9 (2517)	1.9 (1.2, 3.1)
Adalimumab	1.6 (17)	0.3 (960)	4.8 (2.9, 7.7)
Etanercept	1.4 (15)	0.4 (1229)	3.3 (2.0, 5.4)
Certolizumab	0.2 (2)	0.01 (36)	14.7 (3.5, 61.3)
Acetaminophen (negative control)	2.1 (22)	7.0 (19,823)	0.3 (0.2, 0.4)
Docetaxel (positive control)	16.2 (173)	0.6 (1817)	29.9 (25.3, 35.5)

Efficacy and Safety of Ustekinumab, an Interleukin 12/23 Inhibitor, in Patients with Active Systemic Lupus Erythematosus: Results of a Phase 2, Randomized Placebo-Controlled Study

Ronald van Vollenhoven¹, Bevra H. Hahn², George C. Tsokos³, Carrie Wagner⁴, Peter Lipsky⁵, Benjamin Hsu⁴, Marc Chevrier⁴, Robert Gordon⁴, Manon Triebel⁶ and Shawn Rose⁴, ¹Amsterdam Rheumatology and Immunology Center ARC, Amsterdam, Netherlands, ²UCLA David Geffen School of Medicine, Los Angeles, CA, ³Division of Rheumatology, Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA, ⁴Janssen Research & Development, LLC, Spring House, PA, ⁵Ampel BioSolutions LLC, Charlottesville, VA, ⁶Janssen Biologics Europe, Leiden, Netherlands

Meeting: 2017 ACR/ARHP Annual Meeting

Conclusion: UST showed significantly better efficacy in clinical and laboratory parameters in the treatment of active SLE compared with placebo, while demonstrating a comparable safety profile. UST may be an effective therapy with a novel mechanism of action in the treatment of SLE.

IL12/23: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Δέρμα,
Μυοσκελετικό και Πεπτικό
Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων