

ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ

ΕΠΕΜΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

30 – 4- 2018

ΕΥΘ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πρ. Δ/ντης Ρευμ.κλινικης Ναυτ. Νοσ. Αθηνων.

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ


ΔΕΣΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. Ιατρική περίθαλψη- παρακλιν. Εξετάσεις –
διαγνωστικές πράξεις .
2. Φαρμακευτική περίθαλψη .
3. Νοσοκομειακή περίθαλψη .
4. Οδοντιατρική περίθαλψη.
5. Φυσικο-θεραπεία , εργοθεραπεία , λουτροθεραπεία ,
ψυχοθεραπεία – ψυχολογική υποστήριξη .
6. Υπηρεσίες αποκατάστασης .
7. Κοινωνικές υπηρεσίες –κατ`οικον φροντίδα .
8. Πρόληψη και προαγωγή υγείας .
9. Επιδόματα – κάλυψη θεραπευτικών μέσων .

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ**



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ




Οροαρνητικές Σπονδυλαρθρίτιδες



Enthesitis: from pathophysiology to treatment

Georg Schett¹, Rik J. Lories², Maria-Antonietta D'Agostino³, Dirk Elewaut⁴, Bruce Kirkham⁵, Enrique R. Soriano⁶ and Dennis McGonagle⁷

Abstract | Entheses are the insertion sites of tendons and ligaments to the bone surface and are essential structures for locomotion. Inflammation of the entheses (enthesitis) is a key feature of psoriatic arthritis and spondyloarthritis. To date, our conceptual understanding of enthesitis remains limited. This Review provides an insight into the pathophysiology of enthesitis, addressing the role of biomechanics, prostaglandin E₂-mediated vasodilation and the activation of innate immune cells in the initiation phase of enthesitis, as well as the role of entheseal IL-23-responsive cells that augment inflammation by producing pro-inflammatory mediators such as IL-17A, IL-22 and TNF. In addition, the molecular steps that translate inflammation into resident tissue responses, resulting in new bone formation, are discussed. The second part of the article summarizes the clinical features of enthesitis, and the role of clinical and imaging instruments in detecting enthesitis are discussed together with their challenges and limitations. Finally, the Review summarizes the current treatment possibilities for enthesitis based on the aforementioned pathophysiological concepts, focusing on the role of cytokine-blocking agents.



ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ



Αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα: Μία συχνή φλεγμονώδης ρευματική πάθηση



- Χρόνια φλεγμονώδης πάθηση.
- Επίπτωση: 0.1-1.4%
- Προσβάλλει 3:1 άντρες:γυναίκες
- Σοβαρότητα νόσου ανάλογη της ΡΑ, μεγαλύτερη όμως διάρκεια νόσου
- Αξονική και περιφερική προσβολή οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία και δυσλειτουργία.
- 90-98% των ασθενών έχουν HLA-B27+
- 25-40% των ασθενών παρουσιάζουν και οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα
- Μικροσκοπικές βλάβες στο έντερο