

Η ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ SJÖGREN ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ SJÖGREN

Πάλλα Π.¹, Παναγιωτόπουλος Κ.¹, Κουτσογιάννη Α.¹, Στεργίου Ι.¹, Βουλγαρέλης Μ.¹, Γουλές Α.¹, Τζιούφας Α.¹, Χατζής Λ.¹


¹Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή

Η νόσος του Sjögren (SjD) είναι ένα χρόνια αυτοάνοσο νόσημα με κύρια προσβολή τους σιελογόνους αδένες

Περίπου το 1/3 των ασθενών θα εμφανίσει σοβαρές συστηματικές εκδηλώσεις σε διάφορα όργανα

Η ανάπτυξη non-Hodgkin λεμφώματος στο 5-10% των ασθενών αποτελεί μια από τις σοβαρότερες εξωαδενικές εκδηλώσεις



Σκοπός της μελέτης

Να εξετάσει την κλινική πορεία και την έκβαση ασθενών με SjD μετά τη διάγνωση λεμφώματος

Μέθοδοι


Διεξήχθη αναδρομική μελέτη παρατήρησης ασθενών με SjD/Λέμφωμα
Καταγράφηκαν:

- ✓ ο τύπος του λεμφώματος,
- ✓ οι θεραπευτικές προσεγγίσεις
- ✓ η πορεία του λεμφώματος και της νόσου SjD
- ✓ μείζονα συμβάματα όπως οι σοβαρές λοιμώξεις
- ✓ η θνητότητα.

Αποτελέσματα

- 80 ασθενείς με SjD που ανέπτυξαν λέμφωμα
- Κύριος ιστολογικός τύπος λεμφώματος: MALT (91,2%, 72/80)
- Μέσος χρόνος εμφάνισης από τη διάγνωση της SjD: 4 έτη
- Μέση παρακολούθηση: 15 έτη

Θεραπευτική προσέγγιση



Αποτελέσματα

Έκβαση

Υποτροπή λεμφώματος σε 33 ασθενείς (41,2%)

19 ασθενείς απεβίωσαν (23,7%) Οκτώ θάνατοι αποδόθηκαν στο υποκείμενο λέμφωμα ενώ στο 63,1% (12/19) των θανόντων υπήρχε υποτροπή του υποκείμενου λεμφώματος.

Πορεία της SjD μετά το λέμφωμα:

34 (42,5%) ασθενείς παρουσίασαν νέα συστηματική δραστηριότητα της νόσου με αύξηση του ESSDAI

Σοβαρά συμβάματα:

10 ασθενείς (12,5%) εμφάνισαν σοβαρές λοιμώξεις


6 ασθενείς (7,5%) παρουσίασαν μη αιματολογική κακοήθεια

Βιοψίες χείλους:

Άυξηση FS στους ασθενείς με υποτροπή λεμφώματος: 4,49 → 5,77

Μείωση FS στους ασθενείς χωρίς υποτροπή λεμφώματος: 4,2 → 3,26

Κλινικές εκδηλώσεις έξαρσης της SjD



■ Πορφύρα	■ Αρθρίτιδα	■ ILD
■ Περιφερική νευροπάθεια	■ Νεφρική προσβολή	■ SGE
■ Προσβολή ΚΝΣ		

Συμπεράσματα

Η μακροχρόνια παρακολούθηση των SjD ασθενών με λέμφωμα αποκαλύπτει πληθώρα κλινικών εκδηλώσεων που σχετίζονται είτε με το λέμφωμα είτε με τη SjD και στις οποίες περιλαμβάνονται και σοβαρές λοιμώξεις.