

**Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ:
10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ**

Χρυσάνθη Στάβερη 1, Χρύσα Λύκουρα 1, Κωνσταντίνος Μελισσαρόπουλος 2, Σταμάτιος-Νικόλαος Λιόσης 3
1Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ρευματολογικό Τμήμα, Πάτρα, 2 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Άγιος
Ανδρέας”, Ρευματολογικό Τμήμα, Πάτρα, 3 Ιατρική Πανεπιστημίου Πατρών, Ρευματολογικό Τμήμα, Πάτρα


Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ΣΕΛ κατά την έναρξη της θεραπείας με RTX

Pt no.	Age (years)	Sex	Disease duration (years)	Previous treatments	Disease manifestations
1	34	F	4	CS, HCQ, MMF, CYC	Nephritis, rash
2	23	F	2	CS, HCQ	Neutropenia
3	50	F	20	CS, IVIG, AZA, CYC,	Bowel vasculitis
4	16	F	5	CS, CYC	Shrinking lung syndrome
5	21	F	5	CS, AZA, CYC, IVIG, HCQ	Lupoid hepatitis
6	44	F	6	CS, CYC	Neuromyelitis optica
7*	14	F	2 months	CS, HCQ	Benign intracranial hypertension
			7	CS, HCQ, MMF, plasmapheresis	Thrombotic thrombopenic purpura
			7	CS, HCQ, CYC, MMF	Nephritis
8	32	F	27	CS, HCQ,	rash, interstitial pneumonitis
9	31	F	3	CS, AZA, MMF, CYC	Nephritis
10	32	F	11	CS, CYC, IVIG	Arthritis, shrinking lung syndrome
11	14	F	2	CS, HCQ	Nephritis
12	22	F	6	CS, MTX	Stomatitis
13	23	F	3	CS, HCQ	Nephritis, rash
14	25	F	1	CS, MMF	Diplopia
					Arthritis
15	23	F	8	CS, HCQ, MTX	Autoimmune hemolytic anemia
16	30	F	3	CS, HCQ	Arthritis
17	31	F	3	CS, MTX, AZA, CYC	Arthritis, camptocormia
18	24	F	2	CS, CYC, IVIG, MMF	Nephritis
19	25	F	6 months	CS, HCQ	Arthritis
20	37	F	3	CS, HCQ, MTX, AZA	Arthritis, livedo reticularis
21	72	F	1	HCQ	Autoimmune hemolytic anemia
22	37	F	5	CS, MMF, CSA	Nephritis
23	52	F	5	HCQ, AZA, MMF, CYC, CS	Nephritis


Εργαστηριακές παράμετροι και η ανταπόκριση μετά από 1 χρόνο των ασθενών με νεφρίτιδα λύκου

Pt no	Creatinine (mg/dL)	eGFR (ml/min)	Urine protein (mg/24h)	Active urine sediment	Response in 1 year
1	0.5	126	2,744	No	Complete
13	0.7	105	1,200	No	Complete
11	0.9	94	2,200	Yes	Complete
18	0.8	105	11,500	Yes	Partial
9	2.7	18	1,210	No	No, dialysis
7	0.7	130	5,280	No	Partial
22	1.4	50	4,250	No	No, dialysis
23	0.5	113	1,062	Yes	Complete


eGFR των ασθενών με νεφρίτιδα λύκου στο baseline, μετά πό 1 χρόνο και μετά από ≥ 10 χρόνια



cSLEDAI-2k μετά πό 1 χρόνο και στην τελευταία επίσκεψη (≥ 10 χρόνια)



Μέση ημερήσια δόση κορτικοειδών μετά από 1 χρόνο και στην τελευταία επίσκεψη (≥ 10 χρόνια) σε σύγκριση με τις τιμές στο baseline



Κλινική ανταπόκριση των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με RTX μετά από 1 χρόνο και ≥ 10 χρόνια με βάση τις εκδηλώσεις του ΣΕΛ

Εκδήλωση	% ανταπόκριση μετά πό 1 χρόνο	% ανταπόκριση μετά πό ≥ 10 χρόνια
Νευροψυχιατρικός ΣΕΛ (N=4)	100	75
Αιματολογικές ανωμαλίες (N=3)	100	66.67
Αγγειίτιδα (N=2)	50	50
Αρθρίτιδα (N=6)	66.67	100
Προσβολή δέρματος και βλεννογόνων (N=4)	50	75
Προσβολή πνευμόνων (N=3)	33.33	66.67
Διάφορες (N=2)	100	100
Νεφρίτιδα (N=8)	75	62.5