

Συμπεράσματα

Παναγιώτης Τρόντζας

Αντίο




Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Νέα βιολογική θεραπεία
Tocilizumab: αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της IL-6

Βελτίωση ποιότητας ζωής

RoACTEMRA



Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

Εναλλακτική λύση στη νεφρίτιδα: Μυκοφαινολικό νάτριο (MPS)

Myfortic



Οστεοπόρωση

Ζολεδρονικό: Ένδειξη μετά το κάταγμα του ισχίου

Aclasta

Νέα Κατάγματα μετά Χειρουργική Αποκατάσταση Κατάγματος Ισχίου

- Η αναλογία νέων κλινικών καταγμάτων ήταν 8,6% στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέος και 13,9% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, 35% ελάττωση του κινδύνου κατάγματος (P = 0,001)


N Engl J Med 2007: 357

Οστεοπόρωση

Ριζεδρονάτη: Μηνιαία χορήγηση

Actonel 75

Επίπτωση νέων σπονδυλικών καταγμάτων * σε 12 και 24 μήνες




intent-to-treat population
* Ακτινολογικά διαπιστωθέντα

Οστεοπόρωση

Αναστολή RANKL: Νέα ισχυρή αντιαπορροφητική θεραπεία

Denosumab

Αποτελεσματικότητα του denosumab και της αλενδρονάτης στη BMD σε 12 μήνες σε όλες τις μετρούμενες σκελετικές θέσεις



* $P < 0.0001$
** $P = 0.0002$

Brown JP, J Bone Miner Res 2009;24:153-161

Οστεοπόρωση

Μελλοντικά φάρμακα

- **Ανταγωνιστές του υποδοχέα του ασβεστίου**
- **Νέας γενιάς SERM's**
- **Αντισώματα έναντι sclerostin**
- **Ανταγωνιστές ιντεγκρίνης**
- **Αναστολείς Cathepsin-K**

Νευροπαθητικός πόνος

Πρεγκαμπαλίνη: Ρύθμιση της δραστηριότητας των υπερδιεγερμένων νευρώνων

Lyrīca

Σημαντική μείωση του πόνου και σε μακροχρόνιες μελέτες

Μελέτη ευέλικτης δόσης ανοικτής επέκτασης πρεγκαμπαλίνη 150-600 mg




*Ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για 2 χρόνια (n=251)
Data on file, Pfizer Inc.

Νέα αντι-TNFα μόρια

Τα οφέλη της πεγκυλίωσης. Το cetrolizumab pegol

Cimzia




Νέα αντι-TNFα μόρια

Το Golimumab στη ρευματοειδή και τις σπονδυλαρθρίτιδες

Simponi

GO-BEFORE

ACR-50 (24η εβδ.)



Η εμπειρία των βιολογικών θεραπειών στη ΡΑ

Μια δεκαετία με τα βιολογικά φάρμακα

Remicade
Enbrel
Humira

Θεραπεία συνδυασμού

Ένα σημαντικό δίδαγμα των τελευταίων 10 χρόνων
είναι ότι
η προσθήκη ενός αντι-TNF φαρμάκου,
etanercept, adalimumab, ή infliximab
σε ασθενείς που εξακολουθούν να έχουν
ενεργό νόσο παρά την θεραπεία με (DMARD) κύρια MTX,
προσφέρει σημαντική κλινική βελτίωση.

Η εμπειρία των βιολογικών θεραπειών στη ΡΑ

Μια δεκαετία με τα βιολογικά φάρμακα

Anakinra

Kineret

Προκαλεί σημαντική βελτίωση
στα σημεία, συμπτώματα
και

εργαστηριακά ευρήματα της νόσου
μέσα σε 16 βδομάδες.

Επιβραδύνει τον ρυθμό της α/α εξέλιξης

Η εμπειρία των βιολογικών θεραπειών στη ΡΑ

Μια δεκαετία με τα βιολογικά φάρμακα

Orencia

Abatacept σε ασθενείς με ανεπαρκή απάντηση στην MTX

- Σημαντική βελτίωση στην δραστηριότητα της νόσου ήδη από τον δεύτερο μήνα.
- Προοδευτικά βελτιούμενη απάντηση από τον 3^ο έως τον 6^ο μήνα στην μελέτη AIM.
- Υψηλός ρυθμός παραμονής στο φάρμακο.
- Διατήρηση της βελτίωσης στα σημεία και συμπτώματα της νόσου, στην λειτουργικότητα και στην αναστολή της α/α εξέλιξης, κατά την διάρκεια των 3 χρόνων στην μελέτη AIM.

Η εμπειρία των βιολογικών θεραπειών στη ΡΑ

Στοχεύοντας το Β-κύτταρο: το Rituximab ως λύση επιλογής

Rituximab use in everyday clinical practice as a first-line biologic therapy for the treatment of DMARD-resistant rheumatoid arthritis

D. McGonagle^{1,2}, A. L. Tan², J. Madden¹, L. Taylor¹ and P. Emery²

MabThera

Rheumatology key messages

- Rituximab may be a useful first-line biological agent in the clinical setting.
- Rituximab can be safely given to patients with relative contraindications to anti-TNF agents.

Στόχος: ετήσια διεξαγωγή της διημερίδας

- Δημιουργία σταθερού πυρήνα συνέδρων
- Επιλογή χρήσιμων κεντρικών θεμάτων
- Νέες μορφές οργάνωσης
 - Διαδραστικότητα
 - Διεπιστημονικότητα
 - Λόγος και αντίλογος
- Συμμετοχή νέων ρευματολόγων στο βήμα
- Συμπυκνωμένος συνεδριακός χρόνος

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ







St John

3ο Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Ρευματολογική Κλινική Κέντρο Οστεοπόρωσης

ραντεβού

2^η Καλοκαιρινή Επιστημονική Διημερίδα

2010

