

# ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΣ


**«Δεδομένα άλλων βιολογικών  
παραγόντων στη ψωριασική  
αρθρίτιδα».**

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ


Επιστημονική Υπεύθυνη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ιασώ GENERAL



# *ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΣ*

- Η βιβλιογραφία όσο αφορά την χορήγηση Mabthera και Ro-Actemra σε ασθενείς με Ψωριασική Αρθρίτιδα είναι ανύπαρκτη και μη συμπερασματική !!

A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon has a string and is surrounded by small yellow triangular shapes, suggesting a festive or celebratory theme.

**We describe the case of a man with severe PsA with dramatic improvement after rituximab treatment.**

- **ME Perry,1MMChee,1WR Ferrell,1 J C Lockhart,2 R D Sturrock1**
- **1 Centre for Rheumatic Diseases, Glasgow Royal Infirmary, Glasgow, Scotland, UK;**
- **2 School of Engineering & Science, University of Paisley, Paisley, Scotland UK**




The clinical, immunological and radiological features of our patient were characteristic for PsA and, according to the CASPAR (for "classification criteria for psoriatic arthritis") criteria, the diagnosis was established.

-The diagnosis of RA was excluded regarding clinical and radiological characteristics, and negative tests for anti-CCP, RF and absence of HLA-DRB1\*04.


The efficacy of rituximab, associated with MTX, on joint inflammation in our case suggests a role of B cells in PsA.





# tocilizumab

- Our experience shows that tocilizumab
- may be a good alternative for those PsA patients
- with amyloidosis whose disease is resistant to DMARDs
- or anti-TNF $\alpha$  therapy.




# **Orencia(abatacept)**

## ***Use of abatacept in patients with psoriatic arthritis***

- four cases
- reports have been identified which showed improvements in PsA symptoms in three of the four

- 
- 1) Mease P, Genovese MC, Gladstein G et al.  
**Abatacept in the treatment of patients with psoriatic arthritis:**  
Results of a Six-Month, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase II Trial.. Arthritis Rheum 2011;63(4):939-948
  - 2) Mease P, Genovese MC, Gladstein G et al.  
**Abatacept in the Treatment of Psoriatic Arthritis:**  
12-Month Results of a Phase II Study.  
Poster (#2788) presented at ACR/ARHP Annual Scientific Meeting. Atlanta, GA, November 7 11, 2010
  - 3) Vieira FJ, Callado MR, Vieira WP.  
**Abatacept as an option therapy in difficult to treat psoriatic arthritis.**  
Rheumatol Int. 2010 Apr;30(6):849-50

- 
- 4) Cañete JD, Celis R, Hernández V, et al.

Synovial immunopathological changes associated with successful abatacept therapy in a case of severe refractory psoriatic arthritis.

- **Ann Rheum Dis. 2010;69(5):935-6**


- 5) Altmeyer MD, Kerisit KG and Boh EE.

- Abatacept:

- Our experience of use in two patients with refractory psoriasis and psoriatic arthritis.

- **Dermatol Ther 2011;24:287-90**





Θετικά αποτελέσματα για το **Cimzia** της στη **Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ)**.

**Βρυξέλλες, Βέλγιο, 16 Φεβρουαρίου 2012 -**

Η UCB ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει μέχρι το τέλος του 2012 να καταθέσει τον απαραίτητο φάκελο προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές υγείας για την ένδειξη του Cimzia (Certolizumab Pegol) στη Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ), μετά τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3, RAPID-PsA.

Τα αποτελέσματα από την RAPID-PsA φάσης 3 μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Cimzia (Certolizumab Pegol) σε ενήλικες ασθενείς με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα, ανέδειξαν κλινικά σχετική και στατιστικά σημαντική βελτίωση των σημείων και των συμπτωμάτων της ΨΑ την εβδομάδα 12.

Κατά την αρχική ανάλυση της μελέτης δεν προέκυψαν νέα safety signals και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν σύμφωνες με αυτές που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες με το Cimzia.

# Μελέτη φάσης 3, RAPID-PsA, του certolizumab pegol (CZP) στη Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ)

- Πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, παράλληλων ομάδων, φάσης 3 μελέτη 48 εβδομάδων
- Μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του certolizumab pegol σε ενήλικες ασθενείς με ενεργό ΨΑ
  - 409 ασθενείς - 3 σκέλη
    - CZP 400 mg κάθε 4 εβδομάδες
    - CZP 200 mg κάθε 2 εβδομάδες
    - placebo